



ПЕРСЕН®

От бессонницы **Ночь**

Инструкция
по применению лекарственного
препарата для медицинского
применения

Персен® Ночь

Регистрационный номер:

П N013803/01

Торговое название препарата:

Персен® Ночь.

Лекарственная форма: капсулы.

Состав:

Состав одной капсулы:

действующие вещества: валерианы

корневищ с корнями экстракт

(сухой) - 125,000 мг; Melissa

лекарственной листьев экстракт

(сухой) - 25,000 мг; мяты перечной

листьев экстракт (сухой) - 25,000 мг;

вспомогательные вещества:

магния оксид - 6,000 мг; лактозы

моногидрат - 85,500 мг; магния

гидросиликат - 8,100 мг; магния

стеарат - 2,200 мг; кремния диоксид

коллоидный безводный - 3,200 мг;

оболочка капсулы: титана диоксид

E171 - 1,3690 %; железа оксид

красный E172 - 0,7527 %; хинолин

желтый E104 - 0,0153 %; закатно-

желтый E110 (sunset yellow) - 0,0368 %;

азорубин E122 - 0,0438 %;

метилпарагидроксибензоат E128 -

0,2945 %; пропилпарагидрокси-

бензоат E126 - 0,1241 %; желатин -

97,3638 %.

Описание: капсулы №2 (корпус и

крышка) красновато-коричневого

цвета, содержимое капсул -

гранулы или спрессованная масса

от зеленовато-коричневого до
коричневого цвета с вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа:

седативное средство растительного
происхождения.

Код АТХ: N05CM.

Фармакологические свойства

Препарат обладает успокаивающим

и спазмолитическим действием.

Экстракт корневищ с корнями

валерианы оказывает успокаивающее

действие. Экстракт листьев

мелиссы - успокаивающее и

спазмолитическое, экстракт

листьев мяты перечной

спазмолитическое и умеренное

успокаивающее действие.

Показания к применению

• бессонница (трудности при

засыпании), связанная с повышенной

нервной возбудимостью.

Противопоказания

• повышенная чувствительность к

компонентам препарата;

• дефицит лактазы, непереносимость

лактозы, глюкозо-галактозная

мальабсорбция;

• артериальная гипотензия;

• холангит, желчекаменная болезнь

и другие заболевания

желчевыводящих путей;

• беременность;

• период грудного вскармливания;

• детский возраст до 12 лет.

С осторожностью: пациенты с

гастроэзофагеальной рефлюксной

болезнью (ГЭРБ).

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая капсулы

небольшим количеством воды,

независимо от приема пищи.

При бессоннице взрослым и детям старше 12 лет следует принимать по 1-2 капсулы за 1 час перед сном. Не следует принимать препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев. Курс лечения составляет 2-4 недели.

Для увеличения продолжительности курса лечения необходимо проконсультироваться с врачом.

При прекращении лечения синдрома отмены не возникает.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении - запор.

Передозировка

Однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (примерно 39 капсул препарата Персен® Ночь) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, дрожание рук, расширение зрачков, которые могут исчезнуть самостоятельно в течение 24 часов.

При явлениях передозировки целесообразно провести промывание желудка и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (ЦНС), гипотензивных препаратов (в частности, центрального действия), обезболивающих средств, что требует коррекции доз.

Особые указания

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов.

Если во время использования препарата симптомы бессонницы сохраняются или утяжеляются, следует проконсультироваться с врачом.

Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.

Влияние на способность управлять транспортными средствами,

механизмами

В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Капсулы

Первичная упаковка: по 10 капсул в блистер из алюминиевой и поливинилхлорид/термоэласт/поливинилиденхлоридной фольги.

Вторичная упаковка: по 1, 2, 4, 6 или 8 блистеров в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Держатель РУ: Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения;

Произведено: Лек д.д., Веровшкова 57, 1526 Любляна, Словения.

Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3.;

телефон: (495) 660-75-09;

факс: (495) 660-75-10.



SANDOZ
a Novartis company